



Duelmint



antelmintico ad ampio spettro per cani e gatti in pasta orale

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'A.I.C.:

AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA A.T.I. s.r.l.
Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italia
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italia

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

DUELMINT 100 - 100 mg/ml + 5 mg/ml

pasta per uso orale per cani e gatti

DUELMINT 40 - 40 mg/ml + 2 mg/ml

pasta per uso orale per cani di piccola taglia e gatti

DUELMINT 20 - 20 mg/ml + 1 mg/ml

pasta per uso orale per cuccioli e gattini

mebendazolo e praziquantel

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

DUELMINT 100 cani e gatti

1 ml contiene:

Principi attivi: mebendazolo 100 mg - praziquantel 5 mg

- Eccipienti: Controx VP.

DUELMINT 40 cani di piccola taglia e gatti

1 ml contiene:

Principi attivi: mebendazolo 40 mg - praziquantel 2 mg

- Eccipienti: Controx VP.

DUELMINT 20 cuccioli e gattini

1 ml contiene:

Principi attivi: mebendazolo 20 mg - praziquantel 1 mg

- Eccipienti: Controx VP.

4. INDICAZIONI

DUELMINT è indicato nel trattamento delle infestazioni da nematodi e cestodi gastro-intestinali del cane e del gatto.

In particolare:

• **nematodi:**

- ascariidi (*Toxocara* spp., *Toxascaris* spp.)
- ancilostomi (*Ancylostoma* spp., *Uncinaria* spp.)
- tricocefali (*Trichuris* spp.)

• **cestodi:**

- tenie (*Echinococcus* spp., *Dipylidium* spp., *Taenia* spp., *Diphyllobothrium* spp.).

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare contemporaneamente ad antiparassitari esterni a base di esteri fosforici.

6. REAZIONI AVVERSE

In seguito al trattamento possono insorgere vomito e diarrea.

Anche se non è stata osservata negli studi condotti sul prodotto, è possibile riscontrare anoressia, una reazione avversa comune ai prodotti che contengono praziquantel.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

DUELMINT va somministrato in cani e gatti alla posologia di 20 mg di mebendazolo/kg p.v. e di 1 mg di praziquantel/kg p.v. seguendo lo schema sottoriportato.

DUELMINT 100 cani e gatti:

1 cc di pasta, pari ad 1 tacca della siringa, ogni 5 kg di peso vivo una volta al giorno per 3 giorni consecutivi. Una siringa è sufficiente per il trattamento di 25 kg di peso complessivo in un ciclo di terapia.

DUELMINT 40 cani di piccola taglia e gatti:

1 cc di pasta, pari ad 1 tacca della siringa, ogni 2 kg di peso vivo una volta al giorno per 3 giorni consecutivi. Una siringa è sufficiente per il trattamento di 10 kg di peso complessivo in un ciclo di terapia.

DUELMINT 20 cuccioli e gattini:

1 cc di pasta, pari ad 1 tacca della siringa, ogni kg di peso vivo una volta al giorno per 3 giorni consecutivi. Una siringa è sufficiente per il trattamento di 5 kg di peso complessivo in un ciclo di terapia.

Somministrare la pasta tramite siringa (vedi figure) direttamente nella cavità orale dell'animale, preferibilmente alla base della lingua. Non è necessario il digiuno e la pasta può essere somministrata anche miscelata all'alimento.


Per assicurare un corretto dosaggio il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il prodotto è confezionato in tubi siringa provvisti di ghiera dosatrice e di stantuffo graduato in cui ciascuna tacca corrisponde ad un centimetro cubo (cc), equivalente ad 1 ml.


A confezione integra la ghiera dosatrice è posizionata all'estremità dello stantuffo (vedi fig. 1).

Fig.1




Per predeterminare con precisione l'esatta quantità di pasta da somministrare è necessario ruotare la ghiera dosatrice in senso orario.

Fig.2



La ghiera va fermata a destra della tacca corrispondente al numero di cc desiderati (vedi fig. 2), dopo di che, una volta tolto il tappo, è sufficiente premere lo stantuffo fino a fine corsa.

Fig.3



Per le successive somministrazioni, ruotare la ghiera in senso antiorario contando il numero di cc che si vogliono somministrare, e così via fino allo svuotamento completo della siringa.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura non superiore a 25 °C.
Proteggere dalla luce.
Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

In caso di infestazione da ascaridi, è consigliabile ripetere il trattamento ogni 3-4 settimane fino alla negativizzazione dell'esame coprologico per colpire gli adulti sviluppatasi nel frattempo dalle varie forme larvali.

La resistenza dei parassiti a una specifica classe di antelmintici può svilupparsi in seguito all'uso frequente e ripetuto di un principio attivo della stessa classe.

In caso di infestazioni da *Dipylidium caninum*, per prevenire la reinfezione, è necessario condurre un'efficace lotta contro le pulci che fungono da vettore. I cani tenuti in gruppo o in canili devo essere trattati contemporaneamente.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Infestazione da ascaridi e anchilostomi:

in alcuni animali, i parassiti *Ancylostoma caninum* e *Toxocara canis* possono non essere completamente eliminati dal trattamento con conseguente continuo rischio di diffusione delle uova nell'ambiente.

Si consigliano analisi di controllo delle feci e, in base ai risultati di questi esami, se necessario, si può procedere al trattamento con un prodotto nematodocida.

Negli animali debilitati o gravemente infestati, il prodotto deve essere utilizzato solo previa valutazione del rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile.

Non usare in animali con nota ipersensibilità a uno degli ingredienti del prodotto.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

In caso di contatto accidentale, lavarsi accuratamente le mani.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedura d'emergenza, antidoti) se necessario

Anche se per il mebendazolo sono descritti casi di intolleranza gastrica (vomito), DUELMINT, somministrato a dosi fino a tre volte superiori rispetto a quelle indicate per la terapia, non ha provocato effetti collaterali.

Incompatibilità

Non mescolare con altri medicinali.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Novembre 2015.

15. ALTRE INFORMAZIONI

DUELMINT è un antelmintico ad ampio spettro d'azione, costituito da un'associazione di praziquantel e mebendazolo, in grado di controllare tutte le più comuni infestazioni gastro-intestinali dei cani e dei gatti.

La formulazione, sotto forma di pasta appetibile, rende DUELMINT una specialità di grande praticità d'uso ed elevata efficacia.

Praziquantel è una sostanza dotata di attività prevalentemente tenicida, che si è dimostrata efficace contro la maggior parte delle specie di tenie che possono colpire gli animali domestici.

Mebendazolo è un antelmintico che esplica la sua efficacia soprattutto contro i nematodi (vermi tondi) gastro-intestinali e che risulta attivo, a dosi superiori, anche contro alcuni cestodi (tenie o vermi piatti).

Somministrato a dosi fino a tre volte superiori a quelle indicate per la terapia, DUELMINT è perfettamente tollerato e non dà luogo ad effetti collaterali, anche se per il mebendazolo sono descritti casi di intolleranza gastrica (vomito).

Somministrato per via orale mebendazolo è scarsamente assorbito ed eliminato principalmente con le feci in forma immodificata.

Al contrario, praziquantel presenta un assorbimento gastro-intestinale elevato e, dopo metabolizzazione epatica, l'escrezione avviene principalmente con le urine ed in parte con le feci e la bile.

Confezioni:

DUELMINT 100 cani e gatti:

siringa graduata da 15 ml.

DUELMINT 40 cani di piccola taglia e gatti:

siringa graduata da 15 ml.

DUELMINT 20 cuccioli e gattini:

siringa graduata da 15 ml.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.