



STRIKE PASTA

Pyrantel Pamoato

Specialità a base di Pyrantel pamoato, antelmintico appartenente alla famiglia delle tetraidopirimidine, molecole contraddistinte da un ampio spettro d'azione e da una bassa tossicità nei mammiferi in quanto non ben assorbite dal tratto gastrointestinale. Questo riduce il rischio di tossicità sistemica e determina la mancata interferenza dei processi metabolici dell'ospite sul farmaco che potrebbero ridurre l'efficacia antelmintica.

Il Pyrantel, quale potente agonista dei recettori dell'acetilcolina, inibisce la colinesterasi ed esercita una forte azione nicotinosimile, in questo modo produce un'abnorme stimolazione gangliare colinergica sul sistema nervoso dei parassiti che

attraverso un blocco neuronale depolarizzante provoca la contrattura muscolare, la paralisi motoria irreversibile, la morte, il distacco dalla parete intestinale e l'espulsione dall'apparato gastroenterico. Il Pyrantel risulta sicuro ed efficace nell'eliminazione degli strongili gastrointestinali e delle tenie degli equini. Il Pyrantel si è inoltre dimostrato un antelmintico sicuro e ben tollerato nei cavalli e nei ponies in fase di gravidanza e d'allattamento oltre che nei puledri lattanti in fase di svezzamento. Oltre a produrre un effetto benefico sull'equino, sottraendolo all'azione patogena esercitata dai parassiti, il Pyrantel riduce drasticamente la diffusione delle uova nell'ambiente diminuendone il potere infestante, in tal modo riduce la carica parassitaria dei pascoli e dei ricoveri. Strike è pienamente efficace sugli strongili fino a 30 giorni dopo il trattamento.

PRINCIPIO ATTIVO

100 G DI PASTA CONTENGONO

Principio attivo:

Pyrantel Pamoato 38 g
(pari a 13,2 g di Pyrantel base)

INDICAZIONI

Trattamento delle infestazioni gastrointestinali degli equini sostenute da grandi strongili (*Strongylus vulgaris*, *S. edentatus*, *S. equinus*), piccoli strongili (*Triodontophorus* spp., *Cyathostominae*) e cestodi (Tenie: *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*).

CONTROINDICAZIONI

L'impiego è sconsigliato negli animali gravemente debilitati.

REAZIONI AVVERSE

Gli effetti indesiderati più frequentemente osservati sono correlati con l'apparato gastrointestinale, in particolare: anoressia, vomito, diarrea.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Equini

POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: orale

Posologia: 6,6 mg di Pyrantel base /kg p.v./die, pari a 5 g di pasta orale per 100 kg di peso vivo, in unica somministrazione, è efficace nelle infestazioni da nematodi; ad un dosaggio doppio è efficace nelle infestazioni da cestodi.

Infestazioni sostenute da grandi e piccoli strongili

Somministrare con un unico trattamento 5 g di pasta orale per 100 kg di peso dell'equino.

Infestazioni sostenute da cestodi (TENIE)

Somministrare con un unico trattamento 10 g di pasta per

100 kg di peso dell'equino.

Utilizzo della siringa da 35 g e da 50 g.

TEMPO DI ATTESA

Carne e visceri: zero giorni

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Periodo di validità dopo l'apertura della siringa è di 30 giorni

AVVERTENZE

Precauzioni speciali per l'impiego

Negli animali debilitati o fortemente infestati, il prodotto deve essere usato solo dopo una valutazione del rischio / beneficio del veterinario.

Sovradosaggio

Non si sono verificati sintomi di alcun genere in seguito a somministrazioni fino a 6 volte superiori alla dose terapeutica per 3 giorni consecutivi. A dosaggi superiori a quelli consigliati è stato registrato un aumento significativo dei valori di ALT.

CONFEZIONI

Siringa da 35 g

Siringa da 50 g

Scatola contenente 20 siringhe da 35 g

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Senza obbligo di prescrizione

Per ogni ulteriore informazione fare riferimento al RCP del prodotto o al prontuario AISA on-line.