STRIKE GRANULATO

Pyrantel Pamoato

Specialità a base di Pyrantel pamoato, antielmintico appartenente alla famiglia delle tetraidropirimidine, molecole contraddistinte da un ampio spettro d'azione e da una bassa tossicità nei mammiferi in quanto non ben assorbite dal tratto gastrointestinale. Questo riduce il rischio di tossicità sistemica e determina la mancata interferenza dei processi metabolici dell'ospite sul farmaco che potrebbero ridurne l'efficacia antielmintica.
Il Pyrantel, quale potente agonista dei recettori dell'acetilcolina, inibisce la colinesterasi ed esercita una forte azione nicotinosimile, in questo modo produce un'abnorme stimolazione gangliare colinergica sul sistema nervoso dei parassiti che attraverso un blocco neuronale depolarizzante ne provoca la contrattura muscolare, la paralisi motoria irreversibile, la morte, il distacco dalla parete intestinale e l'espulsione dall'apparato gastroenterico. Il Pyrantel risulta sicuro ed efficace nell'eliminazione degli strongili gastrointestinali e delle tenie degli equini. Il Pyrantel si è inoltre dimostrato un antielmintico sicuro e ben tollerato nei cavalli e nei ponies in fase di gravidanza e d'allattamento oltre che nei puledri lattanti in fase di svezzamento.Oltre a produrre un effetto benefico sull'equino, sottraendolo all'azione patogena esercitata dai parassiti, il Pyrantel riduce drasticamente la diffusione delle uova nell'ambiente diminuendone il potere infestante, in tal modo riduce la carica parassitaria dei pascoli e dei ricoveri.
Strike è pienamente efficace sugli strongili fino a 30 giorni dopo il trattamento.

PRINCIPIO ATTIVO

UN G DI GRANULATO CONTIENE

Principio attivo:

Pyrantel pamoato 200 mg
(equivalenti a pyrantel base 69,4 mg)

INDICAZIONI

Trattamento delle infestazioni gastrointestinali degli equini sostenute da Strongili (es. Strongylus vulgaris, Strongylus equinus, Strongylus edentatus).

CONTROINDICAZIONI

L'impiego del Pyrantel è sconsigliato negli animali gravemente debilitati.

REAZIONI AVVERSE

Gli effetti indesiderati più frequentemente osservati sono correlati con l'apparato gastrointestinale in particolare: anoressia, vomito, diarrea.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Equini.

POSOLOGIA, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: orale

Posologia: Somministrare 25 g di granulato ogni 250 kg di peso dell'equino (10 grammi ogni 100 kg di peso) in unica somministrazione.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Somministrare in unica somministrazione.

TEMPO DI ATTESA

Carne e visceri: zero giorni

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Proteggere il medicinale dalla luce. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: barattolo da 1000 g: usare entro 180 giorni.

AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Negli animali debilitati o fortemente infestati, il prodotto deve essere usato solo dopo una valutazione del rischio/beneficio del veterinario. Emorragie digestive (diarrea, feci sanguinolente) possono derivare dal trattamento con antelmintici in caso di infestazioni pesanti.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

Può essere usato durante tutte le fasi della gravidanza e della lattazione.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario.

La somministrazione del farmaco fino a 3 volte la dose terapeutica autorizzata è risultata ben tollerata. Le procedure di emergenza consistono nella somministrazione di farmaci antagonisti dell'acetilcolina.

CONFEZIONI

Astuccio contentente 4 buste da 25 g di granulato
Astuccio contenente 40 buste da 25 g di granulato
Barattolo da 1000 g di granulato con misurino da 25 g

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Senza obbligo di prescrizione.

Per ogni ulteriore informazione fare riferimento al RCP del prodotto o al prontuario AISA on-line.