

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO -  
ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Busta 5 g - Busta 45 g - Busta 100 g

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Metridol 10%, 100 mg/g, polvere orale da somministrare disciolta in acqua da bere,  
per Uccelli da gabbia e da voliera, Uccelli rapaci da falconeria e Colombi viaggiatori.  
Dimetridazolo

**2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE**

1 g di prodotto contiene:

*Principio attivo*

Dimetridazolo 100 mg

Eccipiente q.b. a 1 g

**3. FORMA FARMACEUTICA**

Polvere orale, solubile in acqua.

**4. CONFEZIONI**

Busta 5 g

Busta 45 g

Busta 100 g

**5. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Uccelli da gabbia e da voliera, Uccelli rapaci da falconeria e Colombi viaggiatori.

**6. INDICAZIONE(I)**

Trattamento della tricomoniasi nei colombi, in uccelli rapaci da falconeria e negli uccelli da gabbia e da voliera

**7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Somministrare per via orale disciolto nell'acqua di bevanda ai seguenti dosaggi:

**Uccelli rapaci da falconeria:**

Il prodotto deve essere somministrato alla dose di 0,4 - 0,5 g/kg p.v. al giorno (40-50 mg di principio attivo/kg al giorno), somministrare per 5-7 giorni. Per facilitare la somministrazione, in animali del peso di 1 kg, disciogliere 0,5 g in 5 ml e somministrare per via orofaringea con una siringa non munita di ago. Ripetere la somministrazione nei giorni seguenti e per tutta la durata della terapia.

**Uccelli da gabbia e da voliera:**

Il prodotto deve essere somministrato alla dose di 0,2-0,4 g/kg p.v. (20-40 mg di principio attivo/kg), pari a circa 1-2 g/l d'acqua (100-200 mg di principio attivo/l) per 5 giorni, sospendere per 5 giorni e ripetere per altri 5 giorni.

**Colombi viaggiatori:**

Il prodotto deve essere somministrato alla dose di 0,2-0,4 g/kg p.v (20-40 mg di principio attivo/kg), pari a circa 2-4 g/l d'acqua (200-400 mg di principio attivo/l); somministrare per 3-5 giorni. In

condizioni normali 1 litro di acqua è sufficiente a trattare 20 colombi, nel caso di temperature elevate o dopo attività sportiva i consumi di acqua possono anche raddoppiare.

## **8. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

Non mescolare nei mangimi solidi.

L'assunzione del medicinale da parte degli animali può essere alterata a seguito della malattia. L'utilizzo protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione.

**Controindicazioni:** Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:**

Non superare le dosi consigliate. Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. Nei periodi caldi o di aumentato consumo di acqua somministrare il prodotto disciolto in acqua di bevanda alle dosi indicate, per un periodo di 2-4 ore nelle ore più fresche della giornata. Dopo tale periodo, rimuovere la rimanente acqua e sostituire con acqua fresca non medicata. Ripetere la somministrazione con le stesse modalità nei giorni successivi.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:**

Adottando consueti procedimenti di preparazione o di somministrazione dei prodotti è buona norma evitare l'ingestione, l'inalazione e il contatto con la pelle e con gli occhi e le mucose utilizzando indumenti protettivi, guanti, maschere antipolvere e occhiali protettivi durante la manipolazione e miscelazione del prodotto. In caso di contaminazione accidentale con la cute o gli occhi lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di ingestione accidentale, o in caso di reazione allergica (Gonfiore del viso, delle labbra o degli occhi, o difficoltà respiratorie) rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Non fumare, mangiare o bere mentre si manipola il prodotto. Lavare le mani dopo l'uso

Le persone con nota ipersensibilità al dimetridazolo devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

**Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione:**

Durante l'ovodeposizione il prodotto va somministrato solo in caso di effettiva necessità e solo dopo valutazione del rapporto rischio/ beneficio da parte del medico veterinario responsabile.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:**

Nessuna conosciuta.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario:**

In condizioni particolari (aumento della assunzione di acqua in seguito ad aumento della temperatura, attività sportiva o presenza di nidiata) regolare la somministrazione del medicamento come suggerito nella modalità d'uso. Qualora dopo l'inizio del trattamento si osservino sintomi da sovradosaggio come incoordinazione, atassia e debolezza e tremori muscolari, sospendere immediatamente il trattamento somministrare acqua fresca e complessi vitaminici del gruppo B.

Non superare le dosi indicate.

**Incompatibilità:**

Non miscelare con altri medicinali veterinari.

## **10. DATA DI SCADENZA**

SCAD {mese/anno}

Dopo prima apertura, da usare entro 3 mesi.

Dopo dissoluzione nell'acqua di bevanda, usare entro 24 ore.

**11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare a temperatura inferiore a 25 °C.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e tenerla ben chiusa in un luogo asciutto.

**12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente**

Solo per uso veterinario

Busta 5 g: Da vendersi senza obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.

Busta 45 g: Da vendersi senza obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.

Busta 100 g: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

**14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI”**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI PRODUZIONE (SE DIVERSI)**

Chemifarma S.p.A.  
via Don Eugenio Servadei, 16  
47122 Forlì

**16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Busta 5 g                      A.I.C. n. 103913012

Busta 45 g                    A.I.C. n. 103913024

Busta 100 g                 A.I.C. n. 103913036

**17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto {numero}

Prevedere spazio per codice a lettura ottica DM 17/12/07

spazio per la posologia  
prescritta