

# RIPASOL® VET



Uso veterinario  
Veterinary use

Gocce oculari sterili - Flacone in polietilene 10 ml

Sterile eye drops - Polyethylene bottle 10 ml

IT

## CONFEZIONE

**RIPASOL® VET** flacone da 10 ml in polietilene con tappo a vite, contenente una soluzione acquosa oftalmica sterile, presentato in astuccio in cartone.

## PROPRIETÀ

**RIPASOL® VET** è una soluzione oftalmica sterile, isotonica, costituita da un'associazione allo 0,6 % di acido ialuronico ad alto peso molecolare a lunga catena e di acido ialuronico cross-linkato. Contiene ciclodestrina e povidone ioduro (PVP-I).

**RIPASOL® VET** grazie al contenuto di acido ialuronico lineare e cross-linkato è una soluzione oftalmica con elevata capacità di idratazione e di riepitelizzazione.

La non elevata viscosità della formulazione permette una somministrazione facile e rapida anche negli animali meno collaborativi.

## INDICAZIONI

**RIPASOL® VET** è una soluzione oftalmica indicata in tutte le condizioni di disfunzione quali-quantitativa del film lacrimale e in particolare, nei casi di insufficiente o difettosa idratazione e protezione della superficie oculare, così come nelle lesioni superficiali della cornea connesse a questo deficit.

**RIPASOL® VET** è anche indicato nel completamento dei processi di riparazione corneale dopo terapia con cicatrizzanti.

## MODO D'USO E POSOLOGIA

Lavarsi accuratamente le mani. Estrarre il flacone dall'astuccio in cartone ed eliminare il sigillo di sicurezza in plastica posto sul collo del flacone. Svitare il tappo. Con la mano non dominante tenere ferma e sostenere la testa dell'animale inclinandola leggermente indietro. Con l'altra mano tenere il flacone di **RIPASOL® VET** mantenendo il flacone in posizione verticale sopra l'occhio con la punta rivolta verso il basso. Instillare 1 o 2 gocce di idrogel nell'occhio da trattare, schiacciando leggermente il flacone in plastica e avendo cura di non toccare l'occhio con la punta del flacone. La posologia suggerita è di 1 o 2 gocce nell'occhio da trattare, 3-4 volte al giorno o secondo il parere del Medico Veterinario.



## MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E VALIDITÀ

Mantenere il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore conservando il flacone nell'apposito astuccio in cartone.

Non utilizzare il prodotto dopo il periodo di validità riportato sull'astuccio.

Tale periodo si riferisce al prodotto conservato a temperatura non superiore a 25°C.

Il prodotto può essere utilizzato entro 28 giorni dall'apertura, pertanto, dopo tale periodo, il residuo non utilizzato deve essere eliminato.

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

## AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura danneggiato o non perfettamente chiuso.

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità specifica verso uno dei componenti.

Non ingerire il prodotto.

Tenere lontano dalla portata di bambini.

EN

## PACKAGING

**RIPASOL® VET** 10 ml polyethylene bottle with screw cap, containing a sterile aqueous ophthalmic solution, presented in cardboard pack.

## PROPERTY

**RIPASOL® VET** is a sterile, isotonic ophthalmic solution consisting of a combination of 0,6 % long chain high molecular weight hyaluronic acid and cross-linked hyaluronic acid. Contains cyclodextrin and povidone iodine (PVP-I).

**RIPASOL® VET** thanks to the content of linear and cross-linked hyaluronic acid, is an ophthalmic solution with significant hydration and re-epithelialization properties.

The low viscosity of the formulation allows for a quick and easy administration even in less collaborative animals.

## INDICATIONS

**RIPASOL® VET** is an ophthalmic solution indicated in all conditions of qualitative dysfunction of the tear film and in particular, in cases of insufficient or defective hydration and protection of the eye surface, as well as in superficial lesions of the cornea related to this deficiency. **RIPASOL® VET** is also indicated in the completion of corneal repair processes after healing therapy.

## USE AND DOSAGE

Wash your hands thoroughly.

Remove the bottle from the paper packaging and remove the plastic safety seal on the neck of the bottle.

Unscrew the cap.

With your non-dominant hand, hold and support the animal's head slightly back. With the other hand, hold the bottle of **RIPASOL® VET** holding the bottle upright above the eye with the tip facing down.

Instill 1 or 2 drops of hydrogel in the eye to be treated, by lightly pressing the plastic bottle and taking care not to touch the eye with the tip of the bottle.

The recommended dosage is 1 or 2 drops in the eye to be treated, 3-4 times a day or according to the opinion of the Veterinary Doctor.

## STORAGE AND EXPIRATION

Keep the product away from light and heat sources by storing the bottle in its original paper packaging.

Do not use the product after its expiry date printed on the paper packaging.

This period refers to the product stored at a temperature not exceeding 25 °C.

The product can be used within 28 days of opening, therefore, after that period, the unused residue should be disposed of.

The expiry date refers to an intact and properly stored product.

## WARNINGS

Do not use the product if the packaging is, at the time of its first opening damaged or improperly closed.

Do not use the product in case of specific hypersensitivity to one of its components.

Do not swallow the product.

Keep out of reach of children.



MEDIVIS