INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO - ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO COMBINATI (v. 9.0)

FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI
Scatola da 3 pipette (o 4 o 6 pipette)
CASO n. 1: *Il testo che segue corrisponde ai casi in cui tutte le informazioni del foglietto illustrativo POSSONO essere riportate sull'imballaggio esterno e sul contenitore. Di conseguenza, in questo caso, non è previsto un foglietto illustrativo separato, in conformità con l'attuale template QRD.*

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Frontline Combo 50,00 mg / 60,00 mg soluzione spot-on per gatti.

2. COMPOSIZIONE

Ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

Sostanze attive:
Fipronil……50,00 mg
(S)-methoprene……60,00 mg

Eccipienti:
Butilidrossianisolo (E320)…….0,10 mg
Butilidrossitoluene (E321)…….0,05 mg

FIPRONIL 10% p/v (S) METHOPRENE 12% p/v

Soluzione spot-on di colore ambra chiara.

3. CONFEZIONI

3 x 0,5 ml
4 x 0,5 ml
6 x 0,5 ml

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatto
Furetto

5. INDICAZIONI PER L'USO

Indicazioni per l'uso

Nei gatti :

Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione a zecche e/o pidocchi masticatori.

- Elimina le pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 6 settimane dopo l'applicazione.
- Elimina le zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 2 settimane (in base a dati sperimentali).
- Elimina i pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP).

Nei furetti:
Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole in associazione a zecche.

- Elimina le pulci (*Ctenocephalides* spp). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte.
- Elimina le zecche *(Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente per 4 settimane (in base a dati sperimentali).

Il fipronil elimina le pulci entro 24 ore; le zecche e i pidocchi entro 48 ore dall'infestazione.

6. CONTROINDICAZIONI

Controindicazioni

In mancanza di dati, non usare il prodotto nei gattini di età inferiore alle 8 settimane e/o di peso inferiore a 1 kg. Non usare il prodotto in furetti di età inferiore ai 6 mesi.
Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse al farmaco, potenzialmente mortali. In assenza di studi, si raccomanda di non utilizzare il prodotto in specie diverse da quelle di destinazione.
Non usare in animali malati (es. malattie sistemiche, febbre) o convalescenti.
Non usare in casi di ipersensibilità alle sostanze attive o a uno degli eccipienti.

7. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali

Solo per uso esterno.
L'uso non necessario di antiparassitari o l'uso che si discosta dalle istruzioni fornite nel RCP possono aumentare la pressione selettiva in grado di indurre una resistenza, determinando una riduzione dell'efficacia. La decisione in merito all'uso del prodotto deve basarsi sulla conferma della specie e della carica parassitaria, o del rischio derivante dalle rispettive caratteristiche epidemiologiche, per ogni singolo animale.
Nei gatti e nei furetti, non sono disponibili informazioni di quanto immersioni in acqua/bagni possano interferire sull'attività del prodotto. Comunque, in base ai dati ottenuti da cani lavati a partire da 2 giorni dopo l'applicazione del prodotto, si consiglia di evitare i bagni nei 2 giorni successivi l'applicazione del prodotto.

Singole zecche potrebbero attaccarsi al gatto. Per questa ragione, in condizioni sfavorevoli, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cuccia dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento che, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, dovrebbero essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.
Anche altri animali conviventi devono essere trattati con un prodotto idoneo.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:
Evitare il contatto con gli occhi dell'animale.
È importante che il prodotto sia applicato in una zona in cui l'animale non riesca a leccarsi e fare attenzione affinché gli animali non si lecchino l'un l'altro dopo il trattamento.
La potenziale tossicità del prodotto nei gattini di età inferiore alle 8 settimane a contatto con la madre trattata con il prodotto non è documentata. Si consiglia, in tal caso, di prestare particolare attenzione.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:
Questo prodotto può provocare irritazione alle mucose, alla pelle e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca, la pelle e con gli occhi.
Le persone con nota ipersensibilità al fipronil o all'(S)-methoprene o all'alcool devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Evitare che il contenuto entri in contatto con le mani. In tal caso, lavarsi le mani con acqua e sapone.
In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua pulita.
Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.
Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia quindi di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini.
Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:
Vedere il paragrafo "Precauzioni speciali per lo smaltimento".

Gravidanza e allattamento:
Il medicinale veterinario può essere usato, nei gatti, durante la gravidanza. Per il trattamento nel periodo dell'allattamento, vedere sopra.
Nei furetti, usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile.

Sovradosaggio:
Non superare la dose consigliata.
Il rischio dell'insorgenza di eventi avversi (vedere paragrafo "Eventi avversi") può aumentare in caso di sovradosaggio.

Gatti:
Negli studi di sicurezza non sono stati osservati eventi avversi nei gatti e gattini di 8 settimane e più di età e con peso di circa 1 kg, trattati una volta al mese a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata per sei mesi consecutivi.
Potrebbe manifestarsi prurito a seguito del trattamento.
L'applicazione di un sovradosaggio del medicinale veterinario darà origine ad un aspetto umido e appiccicoso del pelo nel sito di applicazione. Comunque, nel caso in cui avvenga, questo scomparirà nell'arco di 24 ore dall'applicazione.

Furetti:
In furetti di 6 mesi e più di età trattati ogni 2 settimane per quattro volte, a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata, si è osservata, in alcuni soggetti, una diminuzione del peso corporeo.

8. EVENTI AVVERSI

Eventi avversi

Gatti e furetti:
Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):
Reazioni al sito di applicazione (desquamazione della cute[1], perdita di pelo[1], prurito[1], arrossamento[1]). Prurito o perdita di pelo diffusi. Ipersalivazione[2], vomito. Aumentata sensibilità alle stimolazioni[3], abbattimento[3], altri sintomi nervosi[3].

[1] Transitori.
[2] Qualora gli animali si lecchino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente alla natura del carrier.
[3] Reversibili.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati su questa etichetta o tramite il sistema nazionale di segnalazione:
https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria

9. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Uso spot-on.
Un sottodosaggio può determinare l'inefficacia del trattamento e può favorire lo sviluppo di resistenze.

Gatti:
La dose minima è pari a 5 mg/kg di peso corporeo di fipronil e 6 mg/kg di peso corporeo di (S)-methoprene, che corrisponde a una pipetta da 0,5 ml per gatto.

Furetti:
La dose è pari a 50 mg di fipronil e 60 mg di (S)-methoprene, che corrisponde a una pipetta da 0,5 ml per furetto.
Per le infestazioni da pulci e/o zecche, la necessità e la frequenza della ripetizione del(i) trattamento(i) devono essere stabilite in base al parere di un esperto e devono tenere in considerazione la situazione epidemiologica locale e lo stile di vita dell'animale.

10. RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Raccomandazioni per una corretta somministrazione

1- Estrarre la pipetta dalla confezione.
2- Tenere la pipetta diritta. Picchiettare leggermente sulla parte stretta della pipetta in modo che il liquido contenuto rimanga nella parte larga della pipetta. Rompere l'estremità pre-tagliata.

3- Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle. Porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta più volte fino a completo svuotamento applicando il prodotto, in un punto, direttamente sulla pelle.

11. TEMPI DI ATTESA

Tempi di attesa: non pertinente.

12. PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE

Precauzioni speciali per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

13. PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO

Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Questo medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché fipronil e (S)-methoprene potrebbero essere pericolosi per i pesci o per altri organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato.
Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

14. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Classificazione dei medicinali veterinari

AT, BG, CZ, DE, DK, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SV:
Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

CY, GR, IE, NO, UK(NI):
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

15. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONFEZIONI

Confezione contenente 1 blister card da 1 pipetta da 0,5 ml A.I.C. n. 103647018

Scatola di cartone contenente 1 blister card da 3 pipette da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647032
Scatola di cartone contenente 1 blister card da 4 pipette da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647044
Scatola di cartone contenente 2 blister card da 3 pipette da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647020

Confezioni
Blister card da 1 pipetta da 0,5
Scatola con 1 blister card da 3 pipette da 0,5 ml
Scatola con 1 blister card da 4 pipette da 0,5 ml
Scatola con 2 blister card da 3 pipette da 0,5 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

16. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DELL'ETICHETTA

Data dell'ultima revisione dell'etichetta

02/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione.

17. RECAPITI

Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per la segnalazione di sospette reazioni avverse:
Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio 3
20139 Milano, Italia
Tel: +39 02 53551

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin du Calquet
31000 Tolosa, Francia

18. ALTRE INFORMAZIONI

Previene la contaminazione dell'ambiente in cui vivono gli animali trattati dagli stadi immaturi delle pulci.

19. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

20. DATA DI SCADENZA

Exp. {mm/aaaa}

21. NUMERO DI LOTTO

Lot {numero}

FRONTLINE COMBO SPOT- ON GATTI
Etichetta e foglietto illustrativo combinati per blister card da 1 pipetta
Le informazioni seguenti sono riportate sul lato interno dell'etichetta/foglietto illustrativo combinati.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Frontline Combo 50,00 mg / 60,00 mg soluzione spot-on per gatti.

2. COMPOSIZIONE

Ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

Sostanze attive:
Fipronil……50,00 mg
(S)-methoprene……60,00 mg
Eccipienti:
Butilidrossianisolo (E320)…….0,10 mg
Butilidrossitoluene (E321)…….0,05 mg

FIPRONIL 10% p/v (S) METHOPRENE 12% p/v

Soluzione spot-on di colore ambra chiara.

3. CONFEZIONI

0,5 ml

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatto
Furetto

5. INDICAZIONI PER L'USO

Indicazioni per l'uso

Nei gatti:
Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione a zecche e/o pidocchi masticatori.
- Elimina le pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 6 settimane dopo l'applicazione.
- Elimina le zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 2 settimane (in base a dati sperimentali).
- Elimina i pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP).

Nei furetti:
Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche.
- Elimina le pulci (*Ctenocephalides* spp). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte.
- Elimina le zecche (*Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente per 4 settimane (in base a dati sperimentali).

6. CONTROINDICAZIONI

Controindicazioni

In mancanza di dati, non usare il prodotto nei gattini di età inferiore alle 8 settimane e/o di peso inferiore a 1 kg. Non usare il prodotto in furetti di età inferiore ai 6 mesi.
Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse al farmaco, potenzialmente mortali. In assenza di studi, si raccomanda di non utilizzare il prodotto in specie diverse da quelle di destinazione.
Non usare in animali malati (es. malattie sistemiche, con febbre) o convalescenti.
Non usare in casi di ipersensibilità alle sostanze attive o a uno degli eccipienti.
In assenza di dati di sicurezza, nei gatti e nei furetti l'intervallo minimo di trattamento deve essere di 4 settimane.

7. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali
L'uso non necessario di antiparassitari o l'uso che si discosta dalle istruzioni fornite nel RCP possono aumentare la pressione selettiva in grado di indurre una resistenza, determinando una riduzione dell'efficacia. La decisione in merito all'uso del prodotto deve basarsi sulla conferma della specie e della carica parassitaria, o del rischio derivante dalle rispettive caratteristiche epidemiologiche, per ogni singolo animale.
Nei gatti e nei furetti, non sono disponibili informazioni di quanto immersioni in acqua/bagni possano interferire sull'attività del prodotto. Comunque, in base ai dati ottenuti da cani lavati a partire da 2 giorni dopo l'applicazione del prodotto, si consiglia di evitare i bagni nei 2 giorni successivi l'applicazione del prodotto.
Singole zecche potrebbero attaccarsi al gatto. Per questa ragione, in condizioni sfavorevoli, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.
Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cuccia dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento che, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, dovrebbero essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.
Anche altri animali conviventi devono essere trattati con un prodotto idoneo.

<u>Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:</u>
Evitare il contatto con gli occhi dell'animale.
È importante che il prodotto sia applicato in una zona in cui l'animale non riesca a leccarsi e fare attenzione affinché gli animali non si lecchino l'un l'altro dopo il trattamento.
La potenziale tossicità del prodotto nei gattini di età inferiore alle 8 settimane a contatto con la madre trattata con il prodotto non è documentata. Si consiglia, in tal caso, di prestare particolare attenzione.

<u>Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:</u>

Questo prodotto può provocare irritazione alle mucose, alla pelle e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca, la pelle e con gli occhi.
Le persone con nota ipersensibilità al fipronil o all'(S)-methoprene o all'alcool devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Evitare che il contenuto entri in contatto con le mani. In tal caso, lavarsi le mani con acqua e sapone.
In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua pulita.
Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.
Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia quindi di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini.
Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:
Vedere il paragrafo "Precauzioni speciali per lo smaltimento".

Gravidanza e allattamento:
Il medicinale veterinario può essere usato, nei gatti, durante la gravidanza. Per il trattamento nel periodo dell'allattamento, vedere sopra.
Nei furetti, usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile.

Sovradosaggio:
Non superare la dose consigliata.
Il rischio dell'insorgenza di eventi avversi (vedere paragrafo "Eventi Avversi") può aumentare in caso di sovradosaggio.

Gatti:
Negli studi di sicurezza non sono stati osservati eventi avversi nei gatti e gattini di 8 settimane e più di età e con peso di circa 1 kg, trattati una volta al mese a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata per sei mesi consecutivi.
Potrebbe manifestarsi prurito a seguito del trattamento.
L'applicazione di un sovradosaggio del medicinale veterinario darà origine ad un aspetto umido e appiccicoso del pelo nel sito di applicazione. Comunque, nel caso in cui avvenga, questo scomparirà nell'arco di 24 ore dall'applicazione.
Furetti:
In furetti di 6 mesi e più di età trattati ogni 2 settimane per quattro volte, a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata, si è osservata, in alcuni soggetti, una diminuzione del peso corporeo.

8. EVENTI AVVERSI

Eventi avversi

Gatti e furetti:
Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):
Reazioni al sito di applicazione (desquamazione della cute[1], perdita di pelo[1], prurito[1], arrossamento[1]). Prurito o perdita di pelo diffusi. Ipersalivazione[2], vomito. Aumentata sensibilità alle stimolazioni[3], abbattimento[3], altri sintomi nervosi[3].

[1] Transitori.
[2] Qualora gli animali si lecchino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente alla natura del carrier.
[3] Reversibili.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati su questa etichetta o tramite il sistema nazionale di segnalazione:
https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria

9. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Uso spot-on.
Un sottodosaggio può determinare l'inefficacia del trattamento e può favorire lo sviluppo di resistenze.

Gatti:
La dose minima è pari a 5 mg/kg di peso corporeo di fipronil e 6 mg/kg di peso corporeo di (S)-methoprene, che corrisponde a una pipetta da 0,5 ml per gatto.

Furetti:
La dose è pari a 50 mg di fipronil e 60 mg di (S)-methoprene, che corrisponde a una pipetta da 0,5 ml per furetto.
Per le infestazioni da pulci e/o zecche, la necessità e la frequenza della ripetizione del(i) trattamento(i) devono essere stabilite in base al parere di un esperto e devono tenere in considerazione la situazione epidemiologica locale e lo stile di vita dell'animale.

10. RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Raccomandazioni per una corretta somministrazione

1- Estrarre la pipetta dalla confezione.
2- Tenere la pipetta diritta. Picchiettare leggermente sulla parte stretta della pipetta in modo che il liquido contenuto rimanga nella parte larga della pipetta. Rompere l'estremità pre-tagliata.
3- Aprire i peli alla base del collo, sul dorso dell'animale, tra le scapole, e mettere in evidenza la pelle. Porre l'apice della pipetta sulla pelle e schiacciare la pipetta più volte fino a completo svuotamento applicando il prodotto, in un punto, direttamente sulla pelle.

11. TEMPI DI ATTESA

Tempi di attesa: non pertinente.

12. PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE

Precauzioni speciali per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sul blister card dopo Exp.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

13. PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO

Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Questo medicinale veterinario non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché fipronil e (S)-methoprene potrebbero essere pericolosi per i pesci o per altri organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.
Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.
Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

14. CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Classificazione dei medicinali veterinari

AT, BG, CZ, DE, DK, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SV:
Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

CY, GR, IE, NO, UK(NI):
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

15. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONFEZIONI

Confezione contenente 1 blister card da 1 pipetta da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647018
Scatola di cartone contenente1 blister card da 3 pipette da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647032
Scatola di cartone contenente 1 blister card da 4 pipette da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647044
Scatola di cartone contenente 2 blister card da 3 pipette da 0,5 ml	A.I.C. n. 103647020

Confezioni
Confezione contenente 1 blister card da 1 pipetta da 0,5 ml
Scatola di cartone contenente1 blister card da 3 pipette da 0,5 ml
Scatola di cartone contenente 1 blister card da 4 pipette da 0,5 ml
Scatola di cartone contenente 2 blister card da 3 pipette da 0,5 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

16. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DELL'ETICHETTA

Data dell'ultima revisione dell'etichetta

02/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione.

17. RECAPITI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per la segnalazione di sospette reazioni avverse:
Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio 3
20139 Milano, Italia
Tel: +39 02 53551

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin du Calquet
31000 Tolosa, Francia

18. ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni

Farmacodinamica:
Fipronil elimina le pulci entro 24 ore; le zecche e i pidocchi entro 48 ore dall'infestazione.

19. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

20. DATA DI SCADENZA

Exp. {mm/aaaa}

21. NUMERO DI LOTTO

Lot {numero}