FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Droncit®

Spot-on
20 mg soluzione
spot-on per gatti

1. Denominazione del medicinale veterinario

Droncit® Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti

2. Composizione

Ogni pipetta contiene:

Sostanze attive:

Praziquantel 20 mg

Eccipienti:

Butilidrossitoluene (BHT - E321) 0,5 mg

N-metil pirrolidone 497,8 mg

Liquido limpido, incolore o leggermente rossastro

3. Specie di destinazione

Gatto.

4. Indicazioni per l'uso

Antielmintico per gatti.

Efficace contro le forme mature ed immature di *Dipylidium caninum* e *Taenia spp.*

Lo spettro d'azione del praziquantel copre tutte le specie importanti di cestodi dei gatti. Esso include specificamente tutte le *Taenia species* che infestano i gatti, *Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus* e *Echinococcus multilocularis*. Il praziquantel è efficace contro tutti gli stadi intestinali di questi parassiti presenti nei gatti.

5. Controindicazioni

Gatti di peso inferiore a 1 kg, in quanto le pipette non sono idonee a dispensare dosaggi adatti a gatti inferiori a 1 kg di peso corporeo.Non usare in caso di ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno degli eccipienti.

6. Avvertenze speciali

Avvertenze speciali:

Nell'ambiente domestico, evitare che il gatto trattato o altri gatti lecchino la zona di applicazione dopo il trattamento. Se ciò dovesse avvenire subito dopo l'applicazione, dal momento che il medicinale veterinario è di sapore amaro, potrebbe occasionalmente verificarsi salivazione. Questo non è un segno di intossicazione e scompare spontaneamente poco dopo, senza trattamento. Evitare che l'animale appena trattato venga a contatto con bambini.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Solo per uso esterno.

Il medicinale veterinario può essere irritante per gli occhi. Prestare attenzione per evitare che il contenuto della pipetta venga in contatto con gli occhi dell'animale oggetto del trattamento. In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario.

Il medicinale veterinario può essere irritante per la cute e per gli occhi. Durante il trattamento indossare guanti e occhiali.

Evitare il contatto con la cute. In caso di contaminazione accidentale, lavare con acqua e sapone.

Lavarsi le mani accuratamente dopo l'uso. Evitare assolutamente qualsiasi contatto della soluzione con gli occhi.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione oculare o cutanea dovesse persistere, rivolgersi ad un medico.

Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario nei gatti durante la gravidanza e l'allattamento o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del medico veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:

Non somministrare contemporaneamente ad altri farmaci.

Sovradosaggio:

Il sovradosaggio può portare a lievi reazioni cutanee che scompaiono spontaneamente in pochi giorni.

Incompatibilità principali:

Nessuna nota.

7. Eventi avversi

Gatto:

Molto rari (< 1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)	Reazione cutanea allergica[1] Dermatite nel sito di applicazione, perdita di pelo nel sito di applicazione, reazione nel sito di applicazione, desquamazione cutanea nel sito di applicazione, secrezione nel sito di applicazione[2] ipersalivazione[3], vomito[3]

[1] *Ipersensibilità locale*

[2] *Lieve essudazione*

[3] *In seguito al leccamento del gatto nel punto di applicazione immediatamente dopo il trattamento, a causa del sapore amaro del medicinale veterinario. Questo non è un segno di intossicazione e scompare dopo breve tempo senza trattamento.*

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione:
https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria.

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Il dosaggio minimo raccomandato è di 8 mg di praziquantel/kg di peso corporeo. Tale dosaggio corrisponde a 1 pipetta per 2,5 kg di peso corporeo.


Peso corporeo	n° pipette
1-2,5 kg	1
> 2,5-5 kg	2
> 5 kg	3

Spot-on per applicazione esterna sulla cute.


9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione

Spot-on per applicazione esterna sulla cute.

La soluzione viene somministrata mediante la pipetta, che rende l'applicazione facile e sicura. Togliere una pipetta dalla confezione. Tenere la pipetta in posizione verticale, svitare e togliere il tappo. Usare il tappo rovesciato per ruotare e togliere il sigillo dalla pipetta.



Con due dita, scostare il pelo sulla parte posteriore del collo, immediatamente dietro la testa, in modo da rendere visibile la cute (vedi figura). Tenendo la pipetta in posizione verticale, appoggiarne la punta sulla cute e, premendo più volte, applicare tutto il contenuto sulla zona interessata. È particolarmente importante applicare la dose su una zona che l'animale non possa leccare.



Trattamento unico.

10. Tempi di attesa

Non pertinente.

11. Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sull'astuccio dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Dopo l'apertura del blister conservare la pipetta non utilizzata al riparo dalla luce.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

13. Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni

Scatola da 4 pipette da 0,5 ml A.I.C. n. 102473016

Scatola da 40 pipette da 0,5 ml A.I.C. n. 102473028

Scatola di cartone contenente quattro pipette in polipropilene da 0,5 ml, confezionate in due blister. Scatola di cartone contenente quaranta pipette in polipropilene da 0,5 ml, confezionate in venti blister.

Blister composto da OPA/Al/PVC e Al.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

11/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it).

16. Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, Kiel D-24106 Kiel
Germania

VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o.
Żwirowa 140
66-400 Gorzów Wlkp.
Polonia

Rappresentanti locali e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

Vétoquinol Italia S.r.l. Via Luigi Galvani, 18 - 47022 Forlì (FC), Italia
Tel. 0543 462411- Email: italy_farmacovigilanza@vetoquinol.com

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

17. Altre informazioni

1007545 0226 B