Drontal®

CUCCIOLO

Sospensione orale, per cani

1. Denominazione del medicinale veterinario

Drontal cucciolo 14,40 mg/ml + 15,00 mg/ml sospensione orale per cani

2. Composizione

Ogni ml contiene:

Sostanze attive:

Pirantel embonato 14,40 mg

Febantel 15,00 mg

Eccipienti:

Composizione qualitativa degli eccipienti e di altri costituenti	Composizione quantitativa se essenziale per la corretta somministrazione del medicinale veterinario
Sodio propionato	2,05 mg
Sodio benzoato	2,05 mg
Rosso cocciniglia A (E124)	0,25 mg

Sospensione di colore rosso pallido.

3. Specie di destinazione

Cane (cucciolo).

4. Indicazioni per l'uso

Per cuccioli e giovani cani fino a un anno di età affetti o a rischio di infezioni parassitarie miste causate da vermi tondi delle seguenti specie:

Ascaridi - *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*

Anchilostomi - *Uncinaria stenocephala*
- *Ancylostoma caninum*

Tricocefali - *Trichuris vulpis*

A causa della precoce comparsa di infestazioni da ascaridi (infestazione intrauterina e galattogena) il trattamento dovrebbe iniziare già all'età di ca. 2 settimane.

È consigliabile ripetere il trattamento a intervalli di 14 giorni.

5. Controindicazioni

Non usare in casi di ipersensibilità alle sostanze attive o a uno degli eccipienti.

6. Avvertenze speciali

Avvertenze speciali:

Il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci.

La possibilità che altri animali nello stesso ambiente possano essere fonte di reinfezione da nematelminti dovrebbe essere presa in considerazione e questi dovrebbero essere trattati secondo necessità con un prodotto appropriato.

L'impiego non necessario di antiparassitari o l'impiego diverso dalle istruzioni fornite nel RCP può aumentare la pressione selettiva della resistenza e portare a una ridotta efficacia. La decisione di impiegare il prodotto deve basarsi sulla conferma delle specie e della carica parassitaria, o del rischio di infezione in base alle sue caratteristiche epidemiologiche, per ogni animale.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Non pertinente.

Precauzioni speciali che devono prese adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

In caso di versamento accidentale sulla cute, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le persone con nota ipersensibilità al Pirantel Embonato e al Febantel devono somministrare il medicinale veterinario con cautela.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acquacorrente. Lavare le mani dopo l'uso.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento:

Non pertinente.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:

Gli effetti antielmintici del pirantel (paralisi spastica) e della piperazina (paralisi neuromuscolare) possono essere antagonizzati quando i due farmaci sono usati insieme. Interazioni del pirantel con medicinali veterinari ad attività colinergica sono presenti in letteratura.

Sovradosaggio:

Un sovradosaggio pari a 5 volte la dose terapeutica di medicinale veterinario è risultato tollerato dai cuccioli e dai cani giovani senza sintomi.

Per un sovradosaggio di 10 volte ci si deve attendere come unico sintomo il vomito.

Incompatibilità principali:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

7. Eventi avversi

Cane (cucciolo):

Rari (da 1 a 10 animali su 10 000 animali trattati)	Disturbi gastrointestinali (diarrea, vomito); Anoressia

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Posologia

La dose è di 15 mg di febantel e 14,4 mg di pirantel embonato per kg di peso corporeo. Questo corrisponde a 1 ml di sospensione per 1 kg di peso corporeo.

Un sottodosaggio potrebbe comportare un uso inefficace e favorire lo sviluppo di resistenza.

La precisione della dose deve essere accuratamente controllata.

Via di somministrazione

Da somministrare per via orale.

La sospensione può essere somministrata direttamente con il dosatore a siringa accluso oppure indirettamente mescolandola con il cibo. Non sono necessarie misure dietetiche.

Agitare prima dell'uso.

Durata d'impiego

L'applicazione è singola per ogni sverminazione.

Un sottodosaggio potrebbe risultare inefficace e favorire lo sviluppo di resistenza.

Per garantire un dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile. Se animali devono essere trattati collettivamente, è necessario creare gruppi ragionevolmente omogenei e dosare tutti gli animali di un gruppo alla dose corrispondente al più pesante.

L'accuratezza del dispositivo di dosaggio deve essere accuratamente controllata.

9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione

10. Tempi di attesa

Non pertinente.

11. Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non utilizzare il medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 settimane.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

13. Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni

Scatola di cartone contenente un flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 102288026

Scatola di cartone contenente un flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 102288014

Confezioni:

Flacone da 50 ml e dosatore a siringa da 5 ml

Flacone da 100 ml e dosatore a siringa da 5 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

07/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it).

16. Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Francia

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324,24106 Kiel

Germania

Vetoquinol BIOWET Sp. z o.o.

Żwirowa 140

66-400 Gorzów Wlkp.

Polonia

Rappresentanti locali e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

Vétoquinol Italia S.r.l. Via Luigi Galvani, 18 - 47022 Forlì (FC), Italia

Tel. 0543 462411- Email: italy_farmacovigilanza@vetoquinol.com

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

1007084 0825 B