

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare AIC e fabbricante responsabile rilascio lotti:

VETOQUINOL

MAGNY VERNONIS- PB189

F-70204 LURE CEDEX

Distributore per l'Italia:

Vétoquinol Italia S.r.l., via Piana 265 - 47032 Bertinoro (FC)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Austria Belgio Cipro Malta Repubblica Ceca Paesi Bassi Grecia Portogallo Slovacchia Ungheria Slovenia Germania Finlandia	Dolpac large dogs tablets
Francia Lussemburgo	Dolpac 25 comprimé
Regno Unito-Irlanda-Italia	Dolpac Compresse per cani di taglia grande
Spagna Polonia	Dolpac large dogs tablets for 20-75 kg
Danimarca Svezia	Dolpac vet large dogs tablets

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Principi attivi

Oxantel 500,70 mg (equivalente a 1397,5 mg di oxantel embonato)

Pyrantel 124,85 mg (equivalente a 360 mg di pyrantel embonato)

Praziquantel 125,00 mg

Eccipienti per una compressa divisibile da 2375 mg.

4. INDICAZIONI

Per il trattamento curativo nei cani con infestazioni parassitarie miste da stadi adulti dei seguenti nematodi e cestodi:

Nematodi: *Toxocara canis*,
Toxascaris leonina,
Ancylostoma caninum,
Uncinaria stenocephala,
Trichuris vulpis.

Cestodi: *Dipylidium caninum*,
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis

Echinococcus granulosus

5. CONTROINDICAZIONI

Vedere paragrafo « Avvertenze speciali ».

6. REAZIONI AVVERSE

In seguito al trattamento possono insorgere vomito e diarrea.

Anche se non è stata osservata negli studi condotti sul prodotto, è possibile riscontrare anoressia, una reazione avversa comune ai prodotti che contengono praziquantel.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il dosaggio raccomandato è di 20 mg di oxantel / 5 mg di pyrantel / 5 mg di praziquantel per kg di peso vivo, ovvero una compressa ogni 25 kg di peso vivo in una singola somministrazione, per via orale.

Somministrare il numero di compresse necessario in base al peso vivo, per via orale, in un'unica somministrazione. E' preferibile che i cani siano a digiuno prima del trattamento. Il cibo può essere somministrato un'ora o più dopo il trattamento.

Peso del cane	Numero di compresse
Da 10,1 a 12,5 kg	½
Da 12,6 a 25 kg	1
Da 25,1 a 50 kg	2
Da 50,1 a 75 kg	3

La compressa può essere divisa in due metà uguali.

I cani che vivono a stretto contatto oppure in canili e/o allevamenti, devono ricevere il trattamento nello stesso momento.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo SCAD

Eliminare eventuali mezze compresse non utilizzate

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

La resistenza dei parassiti a una specifica classe di antelmintici può svilupparsi in seguito all'uso frequente e ripetuto di un principio attivo della stessa classe

Le pulci fungono da ospiti intermedi per una delle tenie comuni – il *Dipylidium caninum*. Le infestazioni da tenie possono ripresentarsi in assenza di un controllo degli ospiti intermedi(pulci).

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Infestazione da ascaridi e anchilostomi:

In alcuni animali, i parassiti *Ancylostoma caninum* e *Toxocara canis* potrebbero non essere completamente eliminati dal trattamento con conseguente continuo rischio di diffusione delle uova nell'ambiente. Si consigliano analisi di controllo delle feci e, in base ai risultati di questi esami, se necessario, si può procedere al trattamento con un prodotto nematodocida.

L'impiego del prodotto non è consigliato nei cuccioli sotto i due mesi d'età o di peso inferiore a 1 kg.

Negli animali debilitati o con infestazioni pesanti, il prodotto deve essere utilizzato solo previa valutazione del rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile

Non usare in animali con nota ipersensibilità a un qualsiasi ingrediente del prodotto.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Alcuni componenti del prodotto possono causare reazioni allergiche o irritazioni cutanee. Evitare il contatto con la pelle. Persone con nota ipersensibilità a un qualsiasi ingrediente del prodotto devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Lavarsi le mani dopo l'uso. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrargli il foglietto illustrativo.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata dimostrata, pertanto l'impiego in cagne gravide o in allattamento non è raccomandato.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non usare contemporaneamente a levamisolo, piperazina o inibitori della colinesterasi

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

La somministrazione del prodotto a cani sani ad una dose 5 volte superiore quella raccomandata per 6 settimane consecutive non ha prodotto reazioni avverse.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

15. ALTRE INFORMAZIONI

Solo per uso veterinario.

Confezioni:

Scatola di cartone con 1 blister da 3 compresse

Scatola di cartone con 6 blister da 3 compresse

Scatola di cartone con 10 blister da 3 compresse

Scatola di cartone con 20 blister da 3 compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.