

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Droncit compresse per cani e gatti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Bayer S.p.A.
V.le Certosa, 130
20156 Milano

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, Kiel
D-24106 Kiel (Germania)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Droncit 50 mg compresse per cani e gatti

Praziquantel

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una compressa da 660 mg contiene:

Principio attivo:

Praziquantel 50 mg

4. INDICAZIONI

Antielmintico per cani e gatti, con effetto specifico contro i cestodi adulti e le forme intestinali immature.

E' efficace contro:


Echinococcus granulosus*, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Mesocostoides corti, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Taenia multiceps, Diphyllbothrium (Spirometra) erinacei.

* Echinococcus granulosus:

Il cane, portatore della tenia echinococco, s'infesta tramite l'ovino, bovino o suino e può trasmettere anche all'uomo l'echinococcosi (idatidosi, forma cistica), grave malattia sociale delle regioni con allevamento ovino.

L'intervento terapeutico e/o profilattico con Droncit (possibilmente programmato su vasta scala) interrompe il ciclo biologico del parassita ed evita la trasmissione all'uomo.

Ciclo dell'Idatidosi



5. CONTROINDICAZIONI

Non somministrare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non somministrare a cani di peso inferiore a 2,5 kg.

6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna conosciuta.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.

La dose base per cani e gatti è di 5 mg/kg p.v.

Quindi: 1 compressa fino a 10 Kg p.v.
2 " da 11 a 20 Kg
3 " da 21 a 30 Kg

Contro il *Diphyllobothrium* (Spirometra) è necessaria la dose di una compressa per 2,5 Kg p.v.

Eventuali sovradosaggi fino al doppio della dose consigliata non sono pregiudizievoli soprattutto nei casi di intervento contro massive infestazioni da tenia echinococco.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Droncit viene tollerato molto bene. Il trattamento va effettuato a digiuno e gli animali devono essere tenuti sotto controllo subito dopo la somministrazione in modo da poter ripetere il trattamento nel caso di eventuale rigetto delle compresse.

Droncit può essere somministrato direttamente o avvolto nella carne, oppure frantumato nell'alimento.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Le pulci fungono da ospiti intermedi e costituiscono quindi una fonte per l'infestazione da *Dipylidium*. Per evitare le reinfestazioni si devono eliminare le pulci dall'animale e dai ricoveri.

E' necessario effettuare la raccolta e la distruzione delle feci emesse dai cani nelle 24 ore successive al trattamento.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Nessuna.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Ai fini di una corretta igiene, la persona che somministra il prodotto deve lavarsi le mani dopo l'uso.

Impiego durante la gravidanza o l'allattamento

Droncit può essere somministrato ai cani e ai gatti durante la gravidanza. Il Praziquantel è considerato sicuro sia per l'animale femmina stesso, sia per il feto e i cuccioli.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Negli animali adulti, dosi fino a 10 volte la dose raccomandata (5 mg/kg p.v.), sono generalmente ben tollerate.

Incompatibilità

Non note.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici ma devono essere conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Luglio 2013

15. ALTRE INFORMAZIONIConfezione

Blister da 2 compresse

Blister da 6 compresse

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Figura cane/gatto

Logo e croce Bayer