

# PRAZITEL® compresse per cani

Prazitel Plus Tablets For Dogs

Prazitel Plus (Denmark)

Prazitel Tablets For Dogs (Spain and Italy)

Strantel vet 150 mg/144 mg/50 mg Tablets for dogs (Sweden)

Strantel Tablets For Dogs (Germany and Norway)



## Composizione qualitativa e quantitativa

Ogni compressa contiene:

### Principi attivi:

Praziquantel	50 mg
Pirantel	50 mg (equivalenti a 144 mg di pirantel embonato)
Febantel	150 mg

## Forma farmaceutica

Compresse

Compresa giallo chiaro con linea di frattura a croce su un lato.

Le compresse possono essere suddivise a metà o in quarti uguali.

## Specie di destinazione

Cani.

## Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Nei cani: trattamento di infezioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

### Nematodi:

**Ascaridi:** *Toxocara canis* e *Toxascaris leonina* (forme adulte e immature).

**Ancilostomi:** *Uncinaria stenocephala* e *Ancylostoma caninum* (adulti).

**Tricocefali:** *Trichuris vulpis* (adulti).

### Cestodi:

**Tenie:** *Echinococcus* spp, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* spp (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*) e *Dipylidium caninum* (forme adulte e immature).

## Controindicazioni

Non somministrare contemporaneamente composti della piperazina.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

## Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Le pulci sono gli ospiti intermedi di un tipo comune di tenia, denominata *Dipylidium caninum*. L'infestazione da tenie si ripresenterà sicuramente se non si attuano misure di controllo sugli ospiti intermedi, come le pulci, i topi, ecc.

L'infestazione da tenie è improbabile nei cuccioli di meno di 6 settimane.

La resistenza di un parassita a una particolare classe di antielmintici può svilupparsi in seguito all'uso frequente, ripetuto di un antielmintico di tale classe.

## Reazioni avverse

In casi molto rari, sono stati osservati disturbi gastrointestinali (diarrea, vomito).

## Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Sono stati riferiti effetti teratogeni attribuiti ad elevate dosi di febantel nella pecora e nel topo.

Non sono stati eseguiti studi nelle cagne durante la prima parte della gravidanza.

L'impiego del prodotto durante la gravidanza deve essere subordinato ad una valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto nelle cagne durante le prime 4 settimane di gravidanza. Non superare la dose consigliata quando si trattano le cagne gravide.

#### Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non somministrare contemporaneamente composti della piperazina poiché gli effetti antielmintici del pyrantel e della piperazina possono essere antagonizzati.

L'uso concomitante di altri composti colinergici può provocare tossicità.

#### Posologia e via di somministrazione

Somministrare solo per via orale.

Per garantire la somministrazione di una dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile.

Per i dosaggi attenersi alle seguenti indicazioni: 15mg/kg mg/kg di peso corporeo per il febantel, 5 mg/kg per il pirantel (equivalente a 14.4 mg pyrantel embonato) e 5 mg/kg per il praziquantel. Equivalente a una (1) compressa di Prazitel Plus per 10 kg di peso corporeo.

Le compresse possono essere somministrate direttamente al cane o nascoste nel cibo. Non è necessario un periodo di digiuno, né prima né dopo il trattamento.

Rivolgersi ad un veterinario per richiedere indicazioni sulla necessità e frequenza di altre somministrazioni.

#### Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Smaltire immediatamente le compresse divise utilizzate.

#### Speciali precauzioni per la conservazione

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

#### Confezioni

Il prodotto si presenta in:

Striscia singola composta da un foglio di alluminio da 30µm e da politene estruso 30 gsm, contenente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 compresse

O Confezioni in singoli blister costituiti da un foglio di alluminio flessibile da 45µm e uno di alluminio duro da 25µm contenenti 2 o 8 compresse.

Strip e blister vengono confezionati in cartoni da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 o 1000 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

#### Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola da 2 compresse A.I.C 104188038

Scatola da 4 compresse A.I.C 104188014

Scatola da 104 compresse A.I.C 104188026