

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Prazitel Gatto 230/20 mg Compresse Rivestite appetibili per Gatti

- NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI ZIONE RESPONSABILE DELLA DISTRIBUZIONE DEL LOTTO, SE DIVERSI**

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irlanda

Rappresentante locale:

Esteve S.p.a.

Via Ippolito Rosellini, 12-1° piano

20124 Milano (Italia)



- DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Prazitel Gatto 230/20 mg Compresse Rivestite appetibili per Gatti

Pirantel, Praziquantel.

- INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni compressa rivestita contiene 230 mg di pirantel embonato e 20 mg di praziquantel.

Compresa rivestita, tonda e biconvessa, da bianca a biancastra con una linea di incisione su un lato, piatta sull'altro lato.

- INDICAZIONI**

Per il trattamento delle infestazioni miste causate dai seguenti nematodi e cestodi gastrointestinali:

Nematodi: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*,

Cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*

- CONTROINDICAZIONI**

Non usare simultaneamente a composti contenenti piperazina.

Non trattare gattini di meno di 6 settimane.

Non usare in animali con ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.



**CHANELLE PHARMACEUTICALS
MANUFACTURING LIMITED
LOUGHREA, CO. GALWAY
IRELAND**

6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna conosciuta

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Dosaggio

Il tasso di dosaggio consigliato è il seguente: 20 mg di pirantel (57,5 mg/kg di pirantel embonato) e 5 mg/kg di praziquantel. Ciò equivale a 1 compressa per 4 kg di peso corporeo.

Peso Corporeo	Comprese
1,0-2,0 kg	½
2,1-4,0 kg	1
4,1-6,0 kg	1 ½
6,1-8,0 kg	2

Somministrazione e durata del trattamento

Somministrazione di una singola dose orale. La compressa deve essere somministrata direttamente al gatto, ma se necessario può essere nascosta negli alimenti.

Nelle infestazioni da ascaridi, soprattutto nei gattini, è possibile che l'eliminazione non sia completa, per questo può persistere il rischio d'infezione per l'uomo.

Pertanto, si dovrebbe ripetere il trattamento con un prodotto idoneo contro i nematodi a intervalli di 14 giorni fino a 2-3 settimane dopo lo svezzamento.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per garantire la somministrazione al dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nella maniera più precisa possibile.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.



11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza indicata sul blister e sulla scatola.

CHANELLE PHARMACEUTICALS

MANUFACTURING LIMITED
LOUGHREA, CO. GALWAY

IRF1 AND

Scartare le compresse a metà non utilizzate.

Tenere i blister nella scatola esterna

12. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non usare durante la gravidanza. È possibile somministrarlo durante l'allattamento.

Dopo la somministrazione di dosaggi superiori a 5 volte la dose consigliata, sono stati osservati segni di intolleranza, come vomito.

La resistenza del parassita ad una certa classe di antelmintici si può verificare dopo uso frequente e ripetuto di un antelmintico appartenente a questa classe.

Le pulci fungono da ospiti intermedi per un tipo di tenia comune: *Dipylidium caninum*. L'infestazione da tenie si ripete a meno che non si mantengano sotto controllo gli ospiti intermedi quali pulci, topi, ecc.

Precauzioni speciali per la persona che somministra il prodotto medicinale veterinario agli animali

Nel caso di un'ingestione accidentale, richiedere la consulenza di un medico e mostrare il foglietto illustrativo al medico.

Per una buona igiene, le persone che somministrano le compresse direttamente al gatto o che le aggiungono agli alimenti del gatto, devono lavarsi le mani dopo l'uso.

Solo per uso veterinario.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Chiedere al tuo medico veterinario/farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Dicembre 2013.

- 9 GIU. 2014



15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 o 1000 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

gpc

CHANELLE PHARMACEUTICALS
MANUFACTURING LIMITED
LOUGHREA, CO. GALWAY
IRELAND