

**CRONO-GEST® SPUGNE 20 mg**  
**dispositivo a rilascio controllato per capre e pecore**

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer (Olanda)

**Rappresentante in Italia:**

MSD Animal Health S.r.l.  
Via Fratelli Cervi snc  
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova  
20090 Segrate (Milano)

**Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:**

Intervet Productions S.A.  
Rue de Lyon  
F-27460 Igoville (Francia)

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

CRONO-GEST® SPUGNE 20 mg, dispositivo a rilascio controllato per capre e pecore.  
Cronolone.

**3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ciascuna spugna in poliestere poliuretano contiene 20 mg di cronolone.

**4. INDICAZIONI**

Capra:

Induzione e sincronizzazione dell'ovulazione in associazione con PGF<sub>2α</sub> e PMSG.

Pecora e agnella:

In combinazione con PMSG, induzione e sincronizzazione dell'estro (calori) e dell'ovulazione in qualsiasi periodo dell'anno.

**5. CONTROINDICAZIONI**

Non usare in caso di gravidanza.

**6. REAZIONI AVVERSE**

Alla rimozione della spugna, si può osservare occasionalmente una secrezione mucopurulenta. Non è associata a sintomi clinici e non altera la fertilità.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

**7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Capra e pecora (pecora adulta ed agnella).

**8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

La dose corrisponde ad una spugna per animale, indipendentemente dal peso corporeo, dalla razza, dalla produzione zootecnica (latte o carne), dallo stato fisiologico e dalla stagione.

La durata del trattamento nelle capre è pari a 10-12 giorni e nelle pecore a 14 giorni. Al termine del periodo di somministrazione, la spugna viene estratta delicatamente tramite l'apposita cordicella del dispositivo a rilascio controllato. Non lasciare che le spugne vengano espulse naturalmente dopo parecchie settimane.

Per una sincronizzazione ottimale dell'ovulazione, si raccomanda un'iniezione intramuscolare di PMSG al momento della rimozione della spugna.

Gli animali ovulano dopo 36-72 ore dalla rimozione della spugna.

Nelle pecore, in caso si pratichi l'inseminazione artificiale ad un tempo prefissato, si raccomanda di eseguirla 55 ore dopo la rimozione della spugna.

**9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

La spugna deve essere somministrata per via intravaginale mediante un applicatore.

**10. TEMPI DI ATTESA**

Capre

Carne e visceri: 5 giorni dalla rimozione della spugna.

Latte: 1,5 giorni (3 mungiture), incluso il periodo di trattamento.

Pecore e agnelle:

Carne e visceri: 2 giorni dalla rimozione della spugna.

Latte: zero giorni dalla rimozione della spugna.

**11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare in un luogo asciutto.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: una volta aperto il sacchetto, usare immediatamente. Il prodotto inutilizzato deve essere eliminato.

**12. AVVERTENZE SPECIALI**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:**

Non applicare il metodo Crono-gest a femmine che presentano scoli vaginali né a femmine che hanno appena abortito, senza combattere le cause di aborto.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:**

Nelle capre, il trattamento ripetuto con il prodotto in associazione con PMSG può indurre un aumento di anticorpi anti-PMSG, che possono ridurre l'efficacia del trattamento se associato con l'inseminazione artificiale.

Nelle pecore, trattamenti ripetuti con il prodotto combinati con PMSG, possono provocare la comparsa di anticorpi anti-PMSG. Ciò può influire sul tempo di ovulazione e può perciò ridurre la fertilità qualora si utilizzi un tempo di inseminazione prefissato a 55 ore dalla rimozione della spugna.

L'uso dell'applicatore vaginale è raccomandato per l'inserimento corretto delle spugne e per evitare ferite alla vagina.

L'uso ripetuto delle spugne per un anno non è stato valutato.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:**

Deve essere evitato il contatto diretto con la pelle. Quando si utilizza il prodotto, deve essere indossato un abbigliamento protettivo (guanti monouso). In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare la zona interessata con acqua e sapone. Lavarsi le mani dopo il trattamento e prima dei pasti.

L'esposizione a questo prodotto può influenzare la fertilità. Le donne in gravidanza, o sospette di essere in gravidanza, non devono entrare in contatto con questo prodotto.

**Gravidanza e allattamento:**

Non utilizzare in gravidanza.

Può essere utilizzato durante la lattazione.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione:**

Le spugne non devono essere utilizzate insieme ad alcoli, cresoli, fenoli, soluzioni per immersione o disinfettanti analoghi.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):**

Una dose di cronolone superiore di 5 volte rispetto alla normale spugna non ha prodotto effetti collaterali osservabili.

**Incompatibilità:**

In assenza di studi di compatibilità, il prodotto non deve essere miscelato con altri medicinali.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Ottobre 2014.

**15. ALTRE INFORMAZIONI**

La spugne vengono confezionate in sacchetti contenenti 10, 25 o 50 spugne.  
E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.