



IZO S.r.l. a socio unico  
Sede legale: Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia  
Tel 030 2420583 - Fax 030 2420550 – E-mail: [izo@izo.it](mailto:izo@izo.it)  
Unità produttiva: S.S. 234 Km 28.2 – 27013 Chignolo Po (Pv)  
Tel 0382 723014 – Fax 0382 766363 – E-mail [izo.chignolo@izo.it](mailto:izo.chignolo@izo.it)  
Capitale Sociale € 5.950.000,00 interamente versato  
R.E.A. N. 96327 - Commercio Estero BS003241  
Nr. Reg. Imp. di Brescia, CF. e P.IVA: IT 00291440170  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di F-VERSUS S.r.l.

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

### BLAP HELP

Soluzione iniettabile per vacche da latte

#### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

IZO srl a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

#### Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

IZO srl a socio unico S.S. 234 km 28.2, 27013 Chignolo Po, Pavia

### DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

BLAP HELP

Soluzione iniettabile per vacche da latte

### INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

#### Principi attivi:

Sorbitolo	g 50
Glucosio	g 10
Inositolo	g 5
Acetilmetionina	g 12,5
L-Arginina	g 0,6
L-Lisina	g 0,6
Ca gluconato	g 10
Mg (come acetato)	g 0,3
Tiamina cloridrato	g 0,5
Cianocobalamina	mg 0,5
Nicotinamide	g 2,5

#### Eccipienti:

Metil p.idrossibenzoato (E218)	mg 240
Propil p.idrossibenzoato (E216)	mg 60
Acqua p.p.i. q.b. a	ml 500

### INDICAZIONI

Nelle vacche da latte, dopo il parto, per la prevenzione della chetosi, collasso puerperale ed altre turbe puerperali e per trattare tossicosi, ed attivare la lattopoiesi.

### CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

### REAZIONI AVVERSE

Nessuna segnalata. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

### SPECIE DI DESTINAZIONE

Vacche da latte

### POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE



IZO S.r.l. a socio unico  
Sede legale: Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia  
Tel 030 2420583 - Fax 030 2420550 - E-mail: [izo@izo.it](mailto:izo@izo.it)  
Unità produttiva: S.S. 234 Km 28.2 - 27013 Chignolo Po (Pv)  
Tel 0382 723014 - Fax 0382 766363 - E-mail [izo.chignolo@izo.it](mailto:izo.chignolo@izo.it)  
Capitale Sociale € 5.950.000,00 interamente versato  
R.E.A. N. 96327 - Commercio Estero BS003241  
Nr. Reg. Imp. di Brescia, CF. e P.IVA: IT 00291440170  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di F-VERSUS S.r.l.

Il prodotto è somministrato per via endovenosa, endoperitoneale, sottocutanea.

Dosi:

Da 1 a 3 flaconi al giorno a giudizio del Medico Veterinario, per 3-5 giorni, dopo il parto e quando necessario per aiutare la lattazione.

Iniettare lentamente per via endovena.

Nel caso di somministrazione sottocutanea non si devono superare 100 ml per punto di inoculazione.

Endovenosa: 500 – 1000 – 1500 ml /die

Endoperitoneale: 800 – 1000 ml/die

Sottocutanea: 500 ml/die

#### **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Iniettare lentamente nel caso di somministrazione endovenosa.

#### **TEMPO DI ATTESA**

Zero giorni.

#### **PARTICOLARI- PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare al riparo dalla luce.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

#### **AVVERTENZE SPECIALI**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Iniettare lentamente nel caso di somministrazione endovenosa.

Nel caso di somministrazione sottocutanea non si devono superare 100 ml per punto di inoculazione.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:** fare attenzione durante la somministrazione del prodotto per evitare autoiniezioni accidentali.

**Impiego durante la gravidanza, l'allattamento:** può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione:**

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non sono noti effetti da sovradosaggio. Non superare le dosi consigliate.

#### **Incompatibilità**

Non note. Non miscelare con altri medicinali veterinari.

#### **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

#### **DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Dicembre 2013