

Propancat[®] 230/20 mg



compresse appetibili rivestite con film per gatti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSO

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italia

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway, Irlanda

Distributore per l'Italia:

Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. s.r.l.

Ozzano Emilia (BO) Italia

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Propancat 230/20 mg compresse appetibili rivestite con film per gatti

Pirantel embonato, Praziquantel

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principi attivi:

Pirantel embonato 230 mg.

Praziquantel 20 mg.

Compressa rivestita con film, rotonda, biconvessa, di colore da bianco a biancastro, con linea di frattura su un lato e liscia sull'altro lato.

4. INDICAZIONI

Trattamento di infezioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

Nematodi: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*,

Cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*,

Echinococcus multilocularis.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare contemporaneamente a composti a base di piperazina.

Non usare in gattini al di sotto delle 6 settimane di età.

Non usare in animali con ipersensibilità nota ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Dosaggio

La dose consigliata è: 20 mg/kg di pirantel (57,5 mg/kg di pirantel embonato) e 5 mg/kg di praziquantel. Equivalenti a 1 compressa per 4 kg di peso corporeo.

Peso corporeo	Compresse
1,0 - 2,0 kg	½
2,1 - 4,0 kg	1
4,1 - 6,0 kg	1 ½
6,1 - 8,0 kg	2

Somministrazione e durata del trattamento

Somministrazione orale singola.

La compressa può essere somministrata direttamente al gatto o nascosta nel cibo.

In caso di infestazione da ascari, specialmente nei gattini, non ci si può aspettare un'eliminazione completa, pertanto è possibile che persista un rischio di infezione per l'uomo. Occorre quindi ripetere i trattamenti con un prodotto idoneo contro i nematodi a intervalli di 14 giorni fino a 2-3 settimane dopo lo svezzamento.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per assicurare un dosaggio corretto, il peso corporeo dell'animale deve essere determinato in maniera accurata.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sul blister e sull'astuccio.

Le compresse divise e non utilizzate devono essere eliminate.

Conservare il blister nell'imballaggio esterno.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non usare durante la gravidanza, ma si può usare durante l'allattamento.

Sovradosaggio

In seguito a dosi 5 volte superiori a quella raccomandata, sono stati osservati segni di intolleranza, come ad esempio il vomito.

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Le pulci sono gli ospiti intermedi di un tipo comune di tenia: *Dipylidium caninum*. L'infestazione da cestodi si ripresenterà sicuramente se non si attuano misure di controllo sugli ospiti intermedi quali pulci, topi, etc.

La resistenza di un parassita ad una particolare classe di antielmintici può svilupparsi in seguito ad uso frequente, ripetuto di un antielmintico.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Nel rispetto delle norme igieniche, lavarsi le mani dopo aver somministrato le compresse direttamente al gatto o dopo averle mescolate nel suo cibo.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Chiedere al tuo medico veterinario/farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Dicembre 2016

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni

Astuccio da 2 compresse.

Astuccio da 24 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

SOLO PER USO VETERINARIO

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.