

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

WORMAX 10 Flavour
50mg + 500mg *compresse per cani e gatti*
praziquantel + fenbendazolo

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

LOXAVET pharma GmbH
Max Planck Strasse 11
D 85716 UNTERSCHLEIßHEM (Germany)

Distributore:

Ecuphar Italia, S.r.l
Viale Francesco Restelli, 3/7
20124 Milano (Italia)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

WORMAX 10 Flavour 50 mg + 500 mg compresse per cani e gatti
praziquantel + fenbendazolo

3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPI(O) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una compressa aromatizzata e divisibile da 612 mg contiene:

Principi attivi:

Praziquantel	50 mg
Fenbendazolo	500 mg

4. INDICAZIONI

Indicato per il controllo e la terapia delle infezioni da nematodi e cestodi nel cane e nel gatto.

Particolarmente attivo nei confronti delle forme mature ed immature dei seguenti parassiti:

Ascaridi: *Toxocara canis, Toxascaris leonina.*

Anchilostomi: *Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma tubaeforme*

Tricocefali: *Trichuris vulpis.*

Cestoidi: *Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.*

5. CONTROINDICAZIONI

Non somministrare il prodotto durante le prime 4 settimane di gravidanza.

Non utilizzare in soggetti che presentino forme di ipersensibilità nota nei confronti dei principi attivi o ad uno degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Animali trattati con alti dosaggi, i gatti in particolare, possono manifestare episodi di vomito e diarrea. La remissione dei sintomi è comunque spontanea.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane e gatto

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: orale

Per assicurare la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile.

La dose consigliata è di 5mg/kg di praziquantel e di 50mg/kg di fenbendazolo pari a 1 compressa ogni 10kg di peso vivo.

Dosaggio orientativo:

CANI

Cuccioli e cani di piccola taglia:

Peso del cane (kg)	Numero di compresse
½ -2kg p.v.	¼ di compressa
2 – 5 kg p.v.	½ compressa
5 – 10 kg p.v.	1 compressa

GATTI:

Gattini	¼ di compressa
Gatti adulti sino a 5kg	½ compressa
Gatti adulti oltre 5kg	1 compressa

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Somministrare la compressa direttamente in bocca o se necessario mescolarla all'alimento preferito. Verificare sempre la effettiva assunzione del medicinale.

In presenza di infezioni massicce ripetere il trattamento dopo 24 ore.

Non sono necessarie purghe o digiuni o altre particolari misure per assicurare l'efficacia del prodotto.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C

Conservare il blister nella confezione originale per proteggerlo dalla luce e dall'umidità.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola.

Le eventuali frazioni di compressa residue devono essere consumate immediatamente e non conservate.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Prestare attenzione ad evitare le seguenti pratiche perché possono aumentare il rischio di sviluppo di resistenza e potrebbero in definitiva determinare una inefficacia della terapia:

- uso troppo frequente e ripetuto di antelmintici della stessa classe per un periodo prolungato di tempo
- sottodosaggi, dovuti ad una errata stima del peso corporeo, mancata somministrazione del prodotto, o mancanza di calibrazione del dosatore (se esiste).

Casi clinici sospetti di resistenza agli antelmintici devono essere verificati utilizzando test appropriati (es. Test per la Conta della riduzione delle uova fecali). Quando i risultati del test confermano una resistenza ad un particolare antelmintico, deve essere utilizzato un antelmintico appartenente ad una altra classe farmacologica e che abbia un modo di azione diverso.

La selezione di principali geni resistenti che portano allo sviluppo di resistenza, può condurre ad una terapia antelmintica inefficace.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non somministrare il prodotto durante le prime 4 settimane di gravidanza.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Per evitare contaminazioni distruggere le feci emesse nelle 24 ore successive al trattamento.

Lavare le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di irritazione oculare, rivolgersi ad un medico. Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza: Non somministrare nelle prime 4 settimane di gravidanza

Interazioni: Non somministrare contemporaneamente a derivati della piperazina.

Sovradosaggio: In caso di sovradosaggio, (dosaggi sino 5 volte superiori a quelli consigliati), possono verificarsi episodi di vomito e diarrea che regrediscono spontaneamente.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni

Scatola con un blister da 3 compresse

Scatola con 4 blister da 12 compresse (48 compresse)

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.