SATIETY
WEIGHT MANAGEMENT

GESTIONE DEL PESO

CONSIGLIATO PER IL CALO PONDERALE E IL MANTENIMENTO DOPO IL CALO PONDERALE IN CASO DI

- Sovrappeso/obesità
- Diabete mellito stabilizzato associato a sovrappeso/obesità
- Iperlipidemia associata a sovrappeso/obesità

NON RACCOMANDATO IN CASO DI

- Gatti con costipazione conseguente a un apporto elevato di fibre nella dieta
- Gestazione, lattazione e crescita

Disponibile in
sacchi da 400 g, 1,5 kg, 3,5 kg e 6 kg

QUANTITÀ GIORNALIERE RACCOMANDATE E PERIODO D'USO

GATTO ADULTO

PESO IDEALE (kg)	FASE INIZIALE	DOPO 4 SETTIMANE**	MANTENIMENTO DOPO IL CALO PONDERALE
	grammi	grammi	grammi
2	29	23	30
2,5	33	27	35
3	38	30	40
3,5	42	34	45
4	47	37	49
4,5	51	40	54
5	55	43	58
5,5	59	46	62
6	62	49	66
6,5	66	52	70
7	70	55	73
7,5	73	58	77
8	76	61	81

*** Se il gatto non ha perso peso*

Si determina il peso obiettivo del gatto e viene stabilita la quantità di alimento: l'apporto giornaliero raccomandato si basa sul peso ideale dell'animale. La razione iniziale potrebbe richiedere un adattamento durante le visite di follow-up, sulla base della risposta e della perdita di peso di ogni individuo. Un obiettivo di calo dell'1-3% del peso corporeo è normalmente raggiungibile nei primi 3 mesi, e dello 0,5-2% in seguito.

Come viene calcolata la somministrazione di calorie per il mantenimento dopo la perdita di peso?
Il fabbisogno energetico per mantenere stabile il peso corporeo dopo il calo ponderale è inferiore rispetto a quello di gatti che non sono mai stati obesi. Basate su dati scientifici più recenti (Serisier & al. 2011), le nostre razioni di mantenimento dopo la perdita di peso vengono calcolate aumentando la razione prevista per il programma di calo ponderale del +33%.

NOTA: le razioni del programma di mantenimento potrebbero dover essere regolate sulla base dei progressi individuali.

Serisier S. et al. *Weight loss and post weight loss maintenance energy requirement of obese colony cats. (Fabbisogno energetico per il calo ponderale e il mantenimento dopo il calo ponderale in una colonia di gatti obesi.)* **Proc. 21° congresso ECVIM. Siviglia 2011: 209-210.**

CONTROLLO EFFICACE DEL PESO
Favorisce una perdita di peso sana e ne riduce il rischio di ripresa. Il 97% dei gatti ha perso peso nell'arco di 3 mesi.

CONTROLLO DELLA RICHIESTA DI CIBO
L'elevato livello di fibre favorisce il senso di sazietà del gatto tra un pasto e l'altro. Inoltre nell'82% dei casi aiuta a ridurre le richieste insistenti di cibo dei gatti durante il dimagrimento.

MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE
L'elevato contenuto di proteine aiuta a mantenere la massa muscolare durante il periodo di dimagrimento.

INDICE S/O®

Questo prodotto crea un ambiente sfavorevole alla formazione di uroliti di struvite e ossalato di calcio nelle urine.

TENORI ANALITICI

	Per 1000 kcal	Per 100g somministrati
Proteine	111,84 g	34,0 g
Grassi	29,61 g	9,0 g
Carboidrati digeribili (amido)	61,18 g	18,6 g
Estrattivi inazotati	93,09 g	28,3 g
Fibra grezza	48,03 g	14,6 g
Fibra alimentare	79,93 g	24,3 g
Omega 6	6,09 g	1,85 g
Omega 3	1,55 g	0,47 g
EPA + DHA	0,66 g	0,20 g
Calcio	4,44 g	1,35 g
Fosforo	3,72 g	1,13 g
Sodio	1,81 g	0,55 g
Arginina	7,09 g	2,73 g
Energia metabolizzabile*	304 kcal/100 g	

**Secondo l'equazione NRC2006TDF.*

COMPOSIZIONE

Proteina disidratata di pollame, fibre vegetali, tapioca, farina di frumento, proteine animali idrolizzate, glutine di frumento*, glutine di mais, grassi animali, polpa di cicoria, sali minerali, buccia e semi di psyllium, olio di pesce, estratto di calendula (fonte di luteina), glucosamina, cartilagine idrolizzata (fonte di condroitina).

**L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.*

ADDITIVI (KG)**

Additivi alimentari: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, ferro (3b103): 33 mg, iodio (3b201, 3b202): 3,3 mg, rame (3b405, 3b406): 10 mg, manganese (3b502, 3b504): 43 mg, zinco (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Conservanti - Antiossidanti.

*** I valori si riferiscono solamente alle quantità aggiunte nella formulazione, non a quelle che sono naturalmente presenti tra i componenti della dieta.*